

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Таблица П2. Изменение параметров JIP теста при выращивании культур при недостатке серы и различном освещении.

Условия культивирования и время выращивания (ч)	Y(II)	F _v /F _m	V _j	d _v /d _{t0}	ABS/RC	Plabs
Ag-S интенсивность света 167 мкмоль/м ² /сек						
23	0,719	0,77	0,145	0,103	0,915	21,54
41,5	0,629	0,745	0,193	0,147	1	12,1
68	0,254	0,493	0,378	0,421	1,7	0,95
97,5	0,18	0,208	0,285	0,318	5,3	0,13
113,5	0,14	0,175	0,307	0,322	5,9	0,08
137,5	-	0,214	0,215	0,201	4,3	0,23
Ag-S переход с интенсивности света 30 на 300 мкмоль/м ² /сек						
20	0,716	0,798	0,201	0,132	0,821	19,11
28	0,610	0,757	0,165	0,121	0,973	16,2
45	0,731	0,794	0,152	0,103	0,853	25,1
46,25	0,726	0,779	0,194	0,139	0,919	15,8
70,5	0,207	0,356	0,385	0,479	3,5	0,25
99	-	0,197	0,247	0,256	5,2	0,14
121,1	-	0,231	0,261	0,296	4,9	0,17
Ag-S переход с интенсивности света 167 на 30 мкмоль/м ² /сек						
22,25	0,715	0,759	0,128	0,096	0,984	21,8
39,5	0,395	0,623	0,217	0,18	1,33	4,77
40,75	0,355	0,418	0,324	0,314	2,3	0,65
43	0,328	0,418	0,415	0,373	2,1	0,47
66,5	0,322	0,082	0,75	0,667	10,9	0,0003
70,25	0,318	0,111	0,621	0,646	9,33	0,008

93,25	-	0,111	0,621	0,655	9,5	0,008
113,75	-	0,159	0,493	0,529	6,66	0,029